

EPS SURA

Perfil Poblacional

Regional Antioquia

CARACTERIZACIÓN REGIONAL

1. INFORMACIÓN SOCIO DEMOGRÁFICA

La Regional Antioquia y Eje Cafetero, en diciembre de 2018 contaba con 2.104.846 afiliados, los cuales tuvieron la siguiente distribución sociodemográfica:




ILUSTRACIÓN 1. PIRÁMIDE POBLACIONAL REGIONAL ANTIOQUIA




ILUSTRACIÓN 2. CURSO DE VIDA, REGIONAL ANTIOQUIA

El 55% de la población es cotizante y resto de los afiliados son beneficiarios, en el país el 54% son cotizantes y el 46% beneficiarios.




ILUSTRACIÓN 3 TIPO DE COTIZANTE, REGIONAL ANTIOQUIA




ILUSTRACIÓN 4. NIVEL DE INGRESOS, REGIONAL ANTIOQUIA

ESTADO DE SALUD – ÍNDICE DE SALUD

A continuación, se presentan los resultados del índice de salud para la regional Antioquia y el resultado nacional con corte a diciembre de 2018.




ILUSTRACIÓN 5. ÍNDICE DE SALUD REGIONAL ANTIOQUIA Y NACIONAL

CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL – CAPO

Indicadores priorizados para la regional de la caracterización poblacional – CAPO, año 2016-2017.

Indicador	País	Antioquia	Medellín
Prevalencia de hipertensión arterial en personas de 18 a 69 años total	0.50	-	0.12
Tasa ajustada de mortalidad por (grupos y subgrupos lista 6/67)400 - ciertas afecciones originadas en el período perinatal total	48,712	31,711	37,642
Tasa ajustada de mortalidad por (grupos y subgrupos lista 6/67)600 - todas las demás enfermedades601 - diabetes mellitus	38,498	37,929	37,642
Tasa de mortalidad en niños de 1 a 4 años por (grupos lista niñez) 11 - ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal total	0,7815	13,768	23,616
Tasa de mortalidad infantil por (grupos lista niñez) 11 - ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal total	43,872	31,054	37,887

INDICADORES EN SALUD

Los indicadores priorizados por la EPS para la regional Antioquia, para hacer seguimiento y tener alertas son los siguientes:

Población	Indicadores	2017	2018
SANOS	Cobertura vacunación biológicos trazadores PAI	95%	95%
	Tamización para cáncer de cérvix	318,478	250,638
	Actividades de crecimiento y desarrollo	308,855	312,497
	Actividades de planificación familiar	492,996	580,817
	Actividades de salud oral	1,870,829	2,213,645
	Tamizaje para cáncer de mama	81,228	88,490
	Tamizaje agudeza visual	66,288	59,814
GESTANTES	% Embarazo adolescente	9.9	9.1
	% ingreso a control prenatal	98	95
	% Bajo peso al nacer	9.3	9.0
	Transmisión vertical VIH	0	0
	Tasa de sífilis congénita x 1.000	0.36	0.35
	Razón de muerte materna	12	34.95
RCV	Número total de pacientes diabéticos	55,453	68,602
	Prevalencia diabetes (cada 100 afiliados)	2.98	3.26
	% pacientes DM/HTA estudiados para ERC	72.9	27.8

	Mejoría clínica cohorte pacientes diabéticos	62,4%	58%
VIH	Número total de pacientes con VIH	5,010	6,475
	Prevalencia (x 100.000)	268.99	307.53
	Proporción de gestantes tamizadas para VIH (%)	97.7%	95.8%
	Proporción de pacientes con carga viral indetectable a las 48 semanas de terapia antirretroviral (%)	77.6%	86.2%
CÁNCER	Oportunidad de la atención general para cáncer de mama (días entre la consulta por la presencia de síntomas asociados al cáncer hasta el primer tratamiento)	66	67
	Oportunidad de diagnóstico en días para cáncer de próstata (días entre la remisión por sospecha hasta el diagnóstico)	12	48
	Oportunidad de diagnóstico en días para cáncer de colorrectal (días entre la remisión por sospecha hasta el diagnóstico)	28	30
	Mortalidad de cáncer	6.6%	6.4%