

## GUÍA DE ABORDAJE, ESTRATEGIA AIEPI PARA NIÑOS DE DOS MESES A CINCO AÑOS

Todo niño que asista a consulta externa, urgencias o atención no programada deberá ser evaluado bajo los parámetros incluidos en esta ficha de abordaje, más los encontrados en MC-ENF actual y examen físico complementario y deberán quedar plasmados en la HX clínica.

### PREGUNTAS CLAVES PARA DESCARTAR O CONFIRMAR SIGNOS DE PELIGRO GENERAL

¿Puede beber o tomar el seno? .....	NO	Cualquiera de estos síntomas →	<b>SOSPECHE Y DESCARTE ENFERMEDAD GRAVE</b>
¿Vomita todo lo que ingiere? .....	SÍ		
¿Está letárgico o inconsciente? .....	SÍ		
¿Ha tenido convulsiones? .....	SÍ		

### EVALUACIÓN PARA DESCARTAR O DEFINIR PLAN DE ACCIÓN PARA NIÑOS CON DIFICULTAD RESPIRATORIA O TOS

Defina hace cuánto tiempo y número de días	<b>RESPIRACIÓN RÁPIDA</b> De 2 a 11 meses: 50 o más. De 12 meses a 4 años: 40 o más	<b>SOSPECHE Y DESCARTE</b>
Evalúe número de respiraciones por minuto		
¿Hay tiraje subcostal? .....	SÍ	
¿Presenta estridor en reposo? .....	SÍ	
¿Presenta sibilancias? .....	SÍ	
NO síntomas de neumonía		
		Neumonía grave
		Neumonía
		Neumonía
		Sibilancia/asma
		Tos o resfriado

### EVALUACIÓN PARA DESCARTAR O DEFINIR PLAN DE ACCIÓN DE NIÑOS QUE PRESENTAN DIARREA

¿Hay sangre en las heces? .....	SÍ	<b>SOSPECHE Y DESCARTE</b>
En niño se encuentra:		
Letárgico o inconsciente: SÍ		
Intranquilo o irritable: SÍ		
¿El niño tiene los ojos hundidos? .....	SÍ	
¿El niño bebe mal o NO bebe? .....	SÍ	Disenteria
¿El niño bebe con sed? .....	SÍ	
¿El niño presenta el signo de pliegue? .....	SÍ	
¿Hace cuánto tiempo presenta diarrea? .....	≥ 14 días?	
No hay signos de deshidratación	Plan A	
	Con deshidratación	Deshidratación grave
	Sin deshidratación	Algún grado de deshidratación
		Plan B
		Diarrea persistente grave
		Diarrea persistente

### EVALUACIÓN PARA DESCARTAR O DEFINIR PLAN DE ACCIÓN DE NIÑOS CON FIEBRE

Defina hace cuánto tiempo y número de días. ....	¿Ha tenido fiebre todos los días? .....	SÍ	<b>SOSPECHE Y DESCARTE</b>
¿Procede o visitó ZONA MALÁRICA o DENGUE en los últimos 15 días? .....	SÍ		
¿Presenta rigidez de nuca más cualquier signo general de peligro? .....	SÍ		
¿Presenta evidencia de sangrado (petequias, equimosis, epistaxis, etc.)? .....	SÍ		
¿Presenta exantema cutáneo generalizado? .....	SÍ		
Defina si está irritable o inquieto	SÍ		Malaria
¿Presenta tos, coriza u ojos rojos, exantema generalizado > 3 días? .....	SÍ		
Fiebre: Mayor de 38 grados (Sin ninguno de los signos o síntomas anteriores)			
			Enferm. febril muy grave
			Dengue hemorrágico
			Dengue clásico
			Sarampión
			Otra enfermedad febril

### EVALUACIÓN PARA DESCARTAR O DEFINIR PLAN DE ACCIÓN DE NIÑOS CON PROBLEMAS EN EL OÍDO


¿Presenta dolor de oído? SÍ	Inflamación y dolor detrás de la oreja SÍ	<b>SOSPECHE Y DESCARTE</b>
¿El oído está supurando? SÍ		
¿Hace cuánto está supurando? {	< de 2 semanas →	
	> de 2 semanas →	
NO otalgia, NO supuración, otoscopia normal		
		Mastoiditis
		Otitis media aguda
		Otitis media crónica
		No otitis media

### EVALUACIÓN PARA DESCARTAR O DEFINIR PLAN DE ACCIÓN DE NIÑOS CON PROBLEMAS EN GARGANTA

¿Tiene dolor de garganta? .....	SÍ	<b>SOSPECHE Y DESCARTE</b>
¿El niño tiene 3 años o más de edad? .....	SÍ	
¿Presenta exudado blanco en la garganta? .....	SÍ	
¿Presenta ganglios crecidos y dolorosos en el cuello? (>2cm) .....	SÍ	
¿Presenta la garganta eritematosa? .....	SÍ	
¿El niño tiene tres años o menos de edad? .....	SÍ	Faringo-amigdalitis estreptocócica
NO presenta ganglios crecido y dolorosos en el cuello (>2cm) .....	SÍ	
NO disfagia, NO exudados, NO eritema, NO ganglios		
		Faringo-amigdalitis viral
		No amigdalitis



### PREGUNTAS CLAVES PARA DESCARTAR MALTRATO INFANTIL



### EVALUACIÓN PARA DESCARTAR O DEFINIR PLAN DE ACCIÓN EN NIÑOS CON PROBLEMAS DE DESNUTRICIÓN Y ANEMIA




### VERIFICAR ASISTENCIA AL PROGRAMA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA IPS


Verifique si el niño está inscrito y asiste al programa de Crecimiento y Desarrollo ..... **NO** ..... ¿Por qué?

## GUÍA DE ABORDAJE DE LOS NIÑOS DE UNA SEMANA A DOS MESES DE EDAD LA ESTRATEGIA AIEPI


### EVALUACIÓN PARA CONFIRMAR O DESCARTAR INFECCIÓN BACTERIANA



### EVALUACIÓN PARA DESCARTAR O DEFINIR PLAN DE ACCIÓN EN NIÑOS MENOR DE 2 MESES CON DIARREA



### EVALUACIÓN PARA DESCARTAR O DEFINIR PLAN DE SI HAY BAJO PESO O PROBLEMAS DE ALIMENTACIÓN



### VERIFICAR ANTECEDENTES DE VACUNACIÓN P.A.I. TODOS LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS

Edad	RN	2 meses	4 meses	6 meses	12 meses	18 meses	5 años	6-11 meses
	BCG	VOP (1)	VOP (2)	VOP (3)	SRP	VOP (R1)	VOP (R2)	Sarampión
Vacuna	VOP (A)	DPT (1) P	DPT (2) P	DPT (3) P	FA	DPT (R)	DPT (R2)	
	HB (A)	HB (1) P	HB (2) P	HB (3) P			SRP (2)	
		Hib (1) P	Hib (2) P	Hib (3) P				

### CLAVES PARA RESULTADOS ESTRATEGIA AIEPI:

- ✓ Definir cuándo debe volver el niño a consulta de revisión o seguimiento
- ✓ Realizar recomendaciones nutricionales; SIEMPRE eduque a la madre
- ✓ Enseñe signos de alarma y consulta urgente a la madre para la consulta oportuna

SIEMPRE  
RECOMIENDE  
MEDIDAS  
DE BUEN TRATO

**SUSALUD**